

# 抗愛滋病毒藥物服藥說明

核甘類反轉錄酶抑制劑 NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS		
實際外觀	藥名	成人每日服用劑劑及副作用說明
	滋利特 Zerit(stavudine-also known as d4T)	一天二次、每次服用1顆40mg膠囊(體重>60kg) 或一天二次、每次服用1顆30mg膠囊(體重<60kg) 請注意：周邊神經炎、乳酸代謝性酸中毒
	立妥威 Retrovir (zidovudine-also known as ZDV or AZT)	一天二次、每次服用3顆100mg膠囊 請注意：貧血、白血球降低、腸胃不適、乳酸代謝性酸中毒...等
	達汰滋 3TC (lamivudine)	一天二次、每次服用1顆150mg錠劑 (可做為治療B型肝炎使用) 請注意：鮮少發生副作用
	卡貝滋 Combivir (lamivudine/zidovudine)	一天二次、每次服用1顆錠劑、每顆含立妥威300毫克與達汰滋150毫克 請注意：頭痛失眠、貧血、黃疸、莫名發燒喉痛
	惠妥滋 Videx (didanosine-also known as ddl)	一天一次、每次服用1顆250mg膠囊(體重<60kg) 請注意：膀胱炎、周邊神經炎、腸胃不適、腹瀉、乳酸代謝性酸中毒
	濟而剛 Ziagen (abacavir-also known as ABC)	一天二次、每次服用1顆300mg錠劑 請注意：發燒、皮疹、嘔吐、疲憊、咽喉痛、喘、乳酸代謝性酸中毒
	克為滋 Kivexa (lamivudine/abacavir)	一天一次、每次服用1顆錠劑、每顆含達汰滋300mg與濟而剛600mg 請注意：頭痛、嘔吐、腹瀉、疲憊
	惠立妥 Viread (Tenofovir-also known as TDF)	一天一次、每次服用1顆300mg藥片 請注意：頭痛、腹瀉、無力、腎功能受損、乳酸代謝性酸中毒

非核甘類反轉錄酶抑制劑 NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS		
	衛滋 Viramune(nevirapone)	起始劑量：前14天以一天一次、每次服用1顆200mg錠劑 維持劑量：一天二次、每次服用1顆200mg錠劑 請注意：皮疹、肝功能異常、藥物性肝炎等
	希寧 Stocrin(efavirenz)	一天一次、每次於睡前服用1顆600mg錠劑或3顆200mg膠囊 請注意：皮疹、肝功能異常、中樞神經系統症狀、頭暈、嗜睡、多夢、注意力不集中、幻想、失眠

蛋白質酶抑制劑 PROTEASE INHIBITORS		
	克瀟瀟 Crixivan(indinavir)	一天服用三次(2顆400mg)或(4顆200mg)、需空腹服用、(飯前1小時或飯後2小時服藥)、每日飲用至少1.5公升的水、以防腎結石 請注意：泌尿結石、膽紅素上升、血糖上升、脂肪分佈改變症候群
	快利佳 Kaletra (lopinavir/ritonavir)	一天服用一次(4錠)或一天服用二次(2錠)、不需冷藏、空櫃亦可 請注意：腸胃不適、腹瀉、嘔吐、血糖及血脂肪上升、脂肪分佈改變症候群。
	諾德亞 Norvir(ritonavir)	目前並不建議Ritonavir單獨使用、因為藥物動力學的因素、目前都和其他蛋白質酶抑制劑併用、藉以增加其他蛋白質酶抑制劑的血中濃度、需冷藏 請注意：腸胃不適、腹瀉、嘔吐、四肢發麻
	瑞塔滋 Reyataz(atazanavir)	一天一次、每次服用2顆150mg膠囊與1顆100mg Ritonavir並與食物併服為佳、另一處方為每次服用2顆200mg膠囊 請注意：膽紅素上升、血糖上升、脂肪分佈改變症候群
	普利他 Prezista(Darunavir)	一天二次、每次服用2顆400mg錠劑；另一處方為一天兩次、每次服用1顆600mg錠劑。上述處方每次都須合併1顆 Ritonavir並與食物併服為佳。 請注意：皮疹、頭痛、血糖、血脂肪上升、肝功能異常、脂肪位移症候群
	捷伏滋 Aptivus(Tiprenavir)	一天二次、每次服用2顆250mg膠囊與2顆100mg Ritonavir並與食物併服為佳、請注意：肝功能異常、皮疹、血脂肪上升、血糖上升、脂肪位移症候群

嵌合酶抑制劑 INTEGRASE INHIBITOR		
	宜昇瑞 Isentress(Raltegravir)	一天二次、每次服用1顆400mg膜衣錠 請注意：腹瀉、噁心、頭痛、發燒

融合抑制劑 FUSION INHIBITOR		
	福艾 Fuzeon(Enfuvirtide)	90 mg/ 1ml皮下注射一天兩次 請注意：注射部位(紅腫、癢、硬結、搔癢、淤血)過敏 細菌性肺炎增加